

Mitä minun on tiedettävä Lariam-tableteista?

- Lariam on reseptilääke, jota käytetään malarian estoon ja hoitoon. Malaria on hengenvaarallinen infektio. Lariam ei tehoa kaikkiin malariatyyppihin.
- Ota Lariam-tabletteja lääkärin antaman ohjeen mukaan ennen kuin matkustat, matkasi aikana sekä malaria-alueelta palattuasi.
- Älä ota Lariam-tabletteja, jos sinulla on tai on joskus ollut mielenterveyden häiriötä, koska Lariam saattaa aiheuttaa joillekin henkilöille vakavia mielenterveyden häiriötä, kuten **itsemurhan toteuttamisen**,

itsemurha-ajatuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä.

Älä ota Lariam-tabletteja, jos sinulla on tai on joskus ollut:

- masennusta, itsemurha-ajatuksia
- muita mielenterveyshäiriötä, kuten ahdistuneisuushäiriö, skitsofrenia tai psykoosi (kosketuksen menettäminen todellisuuteen)
- kohtauksia (kouristuskohtauksia tai kouristelua)
- allergia kiniinille, kinidiinille, Lariam-tableteille tai jollekin näiden tablettien apuaineista
- vaikea-asteisia maksan toimintahäiriötä
- mustavesikuumetta (malarian

komplikaatio, joka vaikuttaa vereen ja munuaisiin).

Älä ota Lariam-tabletteja, jos parhaillaan käytät malarialääkettä, jota kutsutaan

halofantriiniksi.

Milloin minun on käännyttävä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen?

- Lariam-tablettien käytön aikana on tärkeää olla tietoinen niiden mahdollisista haittavaikutuksista. Lariam-tablettien käytön yhteydessä saattaa esiintyä neuro-psykiatrisia haittavaikutuksia.
- Älä aloita Lariam-tablettien käyttämistä, jos sinulla on tällaisten tapahtumien kehittymisen riski.

(Ks. kohta Älä ota Lariam-tabletteja, jos...).

Lariam saattaa aiheuttaa joillekin henkilöille vakavia mielenterveyden häiriötä. Kerro heti lääkärille, jos sinulla esiintyy jotakin seuraavista Lariam-tabletteja käyttäessäsi:

- itsemurha-ajatuksia
- itsetuhoista käyttäytymistä
- voimakasta ahdistuneisuutta
- epäilyksen tunteita muita kohtaan
- näkö- tai kuuloharhoja
- masennusta
- levottomuuden tunnetta
- poikkeavaa käyttäytymistä tai
- sekavuuden tunnetta
- unettomuutta
- poikkeavia unia/painajaisia.

Hakeudu heti lääkäriin.

Lariam-tablettien käyttö on heti lopetettava ja on siirryttävä käyttämään jotakin toista malarian estolääkitystä.

Muita Lariam-tablettien haittavaikutuksia saattavat olla

kohtaukset (kouristuskohtaukset tai kouristelu), maksan toimintahäiriöt, sydämen toimintahäiriöt, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, heitehuimaus tai tasapaino-ongelmat (kiertohuimaus), päänsärky, univaikeudet (unisuus, unettomuus, painajaiset).

Miten Lariam-tabletteja otetaan:

- Ota tabletit kerran viikossa aina samana viikonpäivänä.
- Ota ensimmäinen Lariam-annos 10 päivää ennen matkasi alkamista, jotta voidaan varmistaa, että Lariam sopii sinulle.
- Ota toinen annos 3 päivää ennen matkasi alkamista.
- Jatka tablettien ottamista koko matkasi ajan ja vielä 4 viikon ajan kotiin palattuasi.

90002186/11

Lariam® 250 mg (meflokiini)

Tässä kortissa on tietoa Lariam-tablettien mahdollisista mielen terveyteen liittyvistä haittavaikutuksista.

Lue myös lääkepakkauksen sisältämä pakkausseloste, josta saat tarkempaa tietoa Lariam-tableteista.

Pidä tämä kortti aina mukana.

Näytä tätä korttia aina lääkärin vastaanotolla käydessäsi.

Milloin minun on käännyttävä lääkärin puoleen?

- Heti, jos sinulle ilmaantuu haittavaikutuksia
- Jos et ole varma, onko sinulla jokin edellä luetelluista sairauksista (***Älä ota Lariam-tabletteja, jos...***)
- Jos epäilet, että sinulla saattaa olla jokin luettelossa mainittu mielen terveyteen liittyvä haittavaikutus (***Lariam saattaa aiheuttaa joillekin henkilöille vakavia mielen terveyden häiriötä...***)

Käytän Lariam (meflokiini) tabletteja malarian estohoitona.

Nimi:

Osoite:

Syntymäaika:

Muut lääkitykset/sairaudet:

Ota hätätapauksessa yhteyttä:

Lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

Lääkärin leima:

Ota yhteyttä myös:

Nimi:

Puh.:

Sukulaisuussuhde:

Fimean hyväksymispäivä 12.07.2024 –
versio 2.0



Potilaskortti

Lariam® 250 mg
(meflokiini)