



Lariam® 250 mg (Meflokin)

Denna information beskriver viktiga möjliga neuropsykiatriska biverkningar med Lariam.

Läs också bipacksedeln som medföljer denna medicin - den ger dig en fullständig information om Lariam.

Behåll detta kort under tiden du behandlas.

Visa detta kort till alla läkare du möter.

När ska jag söka råd från min vårdgivare?

- När du behandlas med Lariam är det viktigt att vara medveten om dess eventuella biverkningar. Neuropsykiatriska biverkningar kan inträffa under behandlingen med Lariam.

Börja inte ta Lariam om du är i riskzonen för att utveckla sådana händelser. (Se vidare under "[Ta inte Lariam om...](#) ").

Jag tar malaria-kemoprophylax med Lariam (meflokin).

Namn:

Adress:

Födelsedatum:

Andra läkemedel och/eller sjukdomar:

I nödfall, vänligen kontakta:

Läkarens namn:

Läkarens telefon:

Läkarens stämpel:

Kontakta även:

Namn:


Telefon:

Relation:



Patientkort

Lariam® 250 mg (Meflokin)



Vad bör jag veta om Lariam?

- Lariam är ett receptbelagt läkemedel som används för att förebygga och behandla malaria. Malaria är en livshotande infektion. Lariam är inte verksamt mot alla typer av malaria.
- Du måste ta Lariam enligt anvisningar från din läkare: innan du reser, under din resa och efter din återkomst från malariaområdet.
- Ta inte Lariam om du har, eller har haft några neuropsykiatriska besvär eftersom Lariam kan orsaka allvarliga neuropsykiatriska problem hos vissa personer. Självmord, självmordstankar och självskadande beteende finns rapporterade.

Ta inte Lariam om du har, eller någon gång vid någon tidpunkt har haft:

- depression, tankar om självmord
- något annat mentalt problem, inklusive generaliserat ångestsyndrom, schizofreni eller psykos (förlorad kontakt med verkligheten)
- krampanfall (epilepsi eller konvulsioner)
- allergi mot klorokin, kinin, kinidin, Lariam eller någon av ingående hjälpämnen
- allvarliga leverproblem
- svartvattenfeber (en komplikation av malaria som påverkar blod och njurar).

Ta inte Lariam om du för närvarande behandlas med ett läkemedel mot malaria som heter:

Halofantrin.

När ska jag kontakta min läkare?

- När som helst om du upplever biverkningar
- Om du är osäker på om du har haft några av de problem som räknas upp tidigare
- Om du tror att du kanske har några av de psykiatriska biverkningarna som finns nämnda under ”[Lariam kan orsaka allvarliga neuropsykiatriska besvär hos vissa personer...](#)”

Lariam kan orsaka allvarliga neuropsykiatriska besvär hos vissa personer. Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande när du tar Lariam

- självmordstankar,
- självskadebeteende,
- svår oro,
- känslor av misstro mot andra,
- se eller hörasakersom inte finns,
- mardrömmar/onormala drömmar,
- sömnlöshet,
- depression,
- rastlöshet,
- ovanligt beteende eller
- förvirring

Vänligen sök medicinsk hjälp omedelbart om du upplever allvarliga psykiska problem eller om ovanstående noteras när du tar Lariam.

Behandlingen med Lariam bör då avslutas omedelbart och ersättas med ett annat läkemedel för att förebygga malaria.

Andra Lariam -biverkningar kan vara:

Muskelkramper, leverproblem, hjärtproblem, illamående, kräkningar, diarré, buksmärter, yrsel eller förlust av balans, huvudvärk, sömnproblem (sömnighet, sömnsvårigheter, mardrömmar).

Hur du tar Lariam

- Använd alltid Lariam enligt läkarens anvisningar.
- Ta alltid veckodosen på samma veckodag.
- Vanlig dos för vuxna: 1 tablett per vecka. Medicineringen skall börja om möjligt 3 veckor men minst 1 vecka före ankomst till malariadrabbat område. Detta är för att se att Lariam-administreringen tolereras väl.
- Du ska fortsätta att ta tablettarna under hela din vistelse och under 4 veckor efter hemkomsten.